

๒. แบบจัดเก็บองค์ความรู้	
องค์ความรู้ เรื่อง การผลิตทุเรียนคุณภาพ	
เจ้าของความรู้ นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	
วันที่บันทึกความรู้ ๑๐/กรกฎาคม./๒๕๖๖	
กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ในการจัดการความรู้	ข้อเสนอแนะ / เอกสารอ้างอิง / คู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้
<p>นายณรงค์ แก้วพิพัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กล่าวว่า การผลิตทุเรียนคุณภาพในจังหวัดพังงา มีดังนี้</p> <p>1. ช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม เป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยว พื้นดิน ปรับดินให้ดำเนินการ</p> <p>1.1 โดโลไมท์ ยิปซัม</p> <p>1.2 ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอิทธิรี</p> <p>1.3 ใส่ปุ๋ยเรียวราก 8-24-24 + 15-0-0 อัตรา 3:1</p> <p>1.4 ตัดแต่งกิ่ง</p> <p>2. ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม เป็นช่วง ทำใบชุดที่1 ให้ใบพร้อมกัน</p> <p>2.1 25-7-7 +15-0-0 ทางดิน</p> <p>2.2 ฉีดพ่นทางใบ 25-7-7 หรือ 30-10-10 สำหรับทะเล ธาตุอาหารรองเสริม สารจับใบ</p> <p>2.3 เร่งใบทางปลาทุ-ใบดาบ ทางดิน15-16-16 + 15-0-0</p> <p>2.4 ฉีดพ่นรักษาใบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ยาฆ่าแมลง - ธาตุอาหารรองเสริม - แคลเซียม โบรอน <p>3. ช่วงเดือน กันยายน - ตุลาคม ทำใบชุดที่ 2</p> <p>3.1 ทางดิน16-16-16</p> <p>3.2 ทางใบ รักษาใบยอดอ่อน ยาฆ่าแมลง สารจับใบ</p> <p>3.3 ช่วงใบดาบ-ใบกาง 0-52-17</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธาตุอาหารรองเสริม แคลเซียม โบรอน <p>3.4 ช่วงใบเพสลาด 10-52-17</p> <ul style="list-style-type: none"> - ธาตุอาหารรองเสริม -แมกนีเซียม - แคลเซียม โบรอน - ยาฆ่าแมลง สารจับใบ 	<p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>1. การใส่ปุ๋ยช่วงฤดูฝน อาจมีการสูญเสียได้ง่าย ควรมีการแบ่งใส่</p>

4. ช่วงเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายนทำใบชุดที่ 3

4.1 ทางดิน 8-24-24

4.2 ทางใบ ช่วงใบดาบ-ใบกาง0-52-34

- สาหร่ายสะสม - ธาตุอาหารรองเสริม แมกนีเซียม

- แคลเซียม โบรอน - ยาฆ่าแมลง สารจับใบ

4.3 ช่วงใบเพลลาด

- ทางดิน 8-24-24

- ทางใบ 0-52-34

- สาหร่ายสะสม ธาตุอาหารรองเสริม

- แคลเซียม โบรอน - ยาฆ่าแมลง สารจับใบ

5. ช่วงเดือน ธันวาคม - มกราคมกักน้ำทำดอก

5.1 งดการใช้น้ำประมาณ 15-25 วัน

5.2 ป้องกันไรแดง

6. ช่วงเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ระยะดอก

- ไข่ปลา - ตาปู - ชาเขียว - เหี้ยดตีนหนู - กระจุม

- มะเขือพวงเล็ก - มะเขือพวงใหญ่ - หัวก้าไล - ดอกขาว

- ดอกบาน - หางแย้

ระยะไข่ปลา - ตาปู ให้ระวังเพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง

- ยาฆ่าแมลง

- 8-24-24

- แคลเซียม-โบรอน

- อะมิโน รองเสริม (เสริม 7-10 วัน/ครั้งระยะดอก

ยกเว้น ดอกขาว-ดอกบาน)

ระยะมะเขือพวงเล็กเป็นระยะที่เหมาะสมในการตัดแต่งดอก

ระยะตาปู ให้น้ำแบบค่อยๆเพิ่ม

ระยะเหี้ยดตีนหนู กระจุมใช้น้ำฉีดพ่นเหมือนระยะตาปู

ระยะมะเขือเล็ก-พวงใหญ่ตัดแต่งดอก ปลายกิ่ง โคนกิ่ง

ข้างกิ่ง กิ่งคนละรุ่น

ระยะหัวก้าไล ให้น้ำปกติ

ดอกหอม (ดอกขาว)

-ฉีดพ่นแคลเซียมโบรอน รองเสริม ยาฆ่าแมลง (เพลี้ยไฟ)

- ลดปริมาณน้ำให้เหลือน้อย (สังเกตที่พวงดอก)

ดอกบาน -เริ่มบาน 4-5 โมงเย็น (เต็มที่19.00-21.00)

<p>-ผสมเกสร (เปิดดอกทุเรียน) ตอน 1 พุ่ม หลังผสมติด (ดอกบาน 3 วัน) จดบันทึกดอกบาน 120 วัน (เก็บเกี่ยว) ทางแย้ แกะหมวกดอกออก ฉีดพ่นเปลี้ยไฟ</p> <p>7. การจดบันทึกหลังดอกบาน 72 ชั่วโมง (3 วัน หลังบาน) 120 วัน เก็บเกี่ยว</p> <p>8. ระยะเวลา</p> <p>ไข่นกกระทา (20-25 วัน) -ตัดแต่งผลครั้งที่ 1 เริ่มตัดแต่งผลที่บิดเบี้ยวคดงอ</p> <p>ระยะไข่ไก่ (30-35 วัน) -ตัดแต่งผลครั้งที่ 2 เริ่มใส่ปุ๋ย 8-24-24 +15-0-0 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน พ่นฆ่าแมลง หนอนเจาะผล และอะมิโน เหมือนระยะดอก</p> <p>- ตัดแต่งผลไม่ได้ทรงออก</p> <p>ไข่ห่าน (40-45 วัน) ปั้นลูกทรงกระบอก - ใส่ปุ๋ย 16-16-16 + 15-0-0 - ทางใบ 16-16-16 แคลเซียมโบรอน - อโทนิค อมิโน รอง เสริม</p> <p>ขวดโหล (60 วัน) -ใส่ปุ๋ย15-5-5 ,15-5-25 70-80-90 วัน (ระยะแบ่งพู สร้างเนื้อ) 90-100-110 วัน - ใส่ปุ๋ยสร้างแป้งเข้าสี 14-7-35 แบ่งใส่2ครั้ง</p> <p>120 วัน เก็บเกี่ยว - ตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แป้ง ใช้ได้ 32% เป้าหมาย 35 %</p> <p>เก็บเกี่ยว ช่วงเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน</p>	<p>ข้อแนะนำ เลือกเก็บเกี่ยวเฉพาะทุเรียนแก่ ไม่ตัด ทุเรียนอ่อน</p> <p>เอกสารอ้างอิง ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี. การดูแลการผลิต ทุเรียนคุณภาพ.สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร</p>
<p>ผู้บันทึกองค์ความรู้ ชื่อ นางสาวอุไรวรรณ สุกดั่ง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ</p>	
<p>สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา.....โทรศัพท์ 096.-.4952873</p>	