



การบริหารจัดการสวนทุเรียน

ในระยะออกดอก - เก็บเกี่ยวผลผลิต

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่

✓ การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต

✓ การบริหารจัดการน้ำ

✓ การจัดการธาตุอาหาร

✓ การจัดการศัตรูพืช

FACEBOOK : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกระบี่



WWW.KRABI.DOAE.GO.TH



075-656018

พัฒนาการดอกทุเรียน



ระยะไข่ปลา



ระยะตาปู



ระยะเหยียดต้นหนุ



ระยะกระดุม



ระยะดอกบาน



ระยะดอกขาว



ระยะหัวทำไล



ระยะมะเขือพวง



ระยะหางแย้



ระยะผลเล็ก



ระยะผลกลาง



ระยะเก็บเกี่ยว

การบริหารจัดการสวนทุเรียน

ในระยะออกดอก - เก็บเกี่ยวผลผลิต

ระยะการเจริญเติบโต	การบริหารจัดการสวนทุเรียน
เตรียมออกดอก (ธันวาคม) 	• 60 วันก่อนออกดอก ฉีดพ่นปุ๋ย 0-52-34 ทางใบยับยั้งใบอ่อนช่วยกระตุ้นการออกดอก • งดการให้น้ำ 7 วัน เมื่อครบ 7 วัน ให้น้ำจนกระทั่งดินมีความชื้นเพื่อกระตุ้นให้ทุเรียนออกดอกพร้อมกันทั้งต้น 
ระยะออกดอก (มกราคม-กุมภาพันธ์) 	1. ระยะไข่ปลา จะเป็นตุ่มเล็ก ๆ บนกิ่ง ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน • เมื่อทุเรียนออกดอกในระยะไข่ปลามีปริมาณมากพอแล้ว เริ่มให้น้ำสม่ำเสมอควรมีความชื้นในดิน (สังเกตจากใบต้องเขียวชุ่ม ห้ามใบตก จมช้ำดอกไม่หักงอ บินดอกต้องมีโพรงไม่แข็งตึง) • ระมัดระวังให้น้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้ตาดอกกลายเป็นใบแขนง 2. ระยะตาปู พัฒนาจากตุ่มเล็ก ๆ ยาวออกมาเป็นตุ่มตาชดขึ้นประมาณ 7 วัน • ให้น้ำสม่ำเสมอและค่อยเพิ่มปริมาณน้ำให้มีปริมาณ 2/3 ของปกติ เพื่อให้ดอกทุเรียนมีการเจริญเติบโตที่ดี 3. ระยะเหยียดต้นหนู ก้านดอกพัฒนายาวออกมาชัดเจนมากขึ้นประมาณ 15 วัน • ให้น้ำสม่ำเสมอและเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นในระดับปกติ 4. ระยะกระดุม จะเริ่มเห็นดอกเป็นทรงกลมๆ ประมาณ 7-8 วัน • ให้น้ำสม่ำเสมอในระดับ 2/3 ของปกติ 5. ระยะมะเขือพวง ดอกเริ่มกลมก้านดอกยาวออกมาเหมือนมะเขือพวง ประมาณ 7-10 วัน • ให้น้ำสม่ำเสมอในระดับปกติ • ควบคุมปริมาณน้ำ โดยสังเกตจากก้านดอก หากก้านดอกแห้งควรเพิ่มการให้น้ำ หากก้านดอกเต่งเกินไปควรลดการให้น้ำ • ตัดแต่งดอก 6. ระยะหัวกำไล ดอกเริ่มเป็นสีเขียว ระยะนี้เกสรตัวเมียจะมีการเจริญเติบโต ส่วนปลายของดอกจะมีส่วนแหลมๆ ประมาณ 7-8 วัน • ให้น้ำสม่ำเสมอในระดับปกติ • ตัดแต่งดอก 7. ระยะดอกขาว เป็นระยะที่ดอกใกล้บาน จะเริ่มเห็นกลีบดอกโผล่ออกมาประมาณ 7-8 วัน • ลดปริมาณการให้น้ำลง 2/3 ของปกติ ** ฉีดสารป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น เพลลิวไฟ เพลลิวแปง ทุก ๆ 7-10 วัน ** ฉีดแคลเซียมโบรอนทางใบ ทุก ๆ 7-10 วัน   

การบริหารจัดการสวนทุเรียน

ในระยะออกดอก - เก็บเกี่ยวผลผลิต

ระยะการเจริญเติบโต	การบริหารจัดการสวนทุเรียน
ระยะดอกบาน (มีนาคม) 	1. ระยะดอกบาน เป็นระยะที่เกิดการผสมเกสรและประมาณ 7-8 วัน - งดการให้น้ำ เพราะหากให้น้ำดอกจะร่วงและกระตุ้นการแตกใบอ่อน (หมั่นสังเกตความชื้นในดิน หากดินแห้งเกินไปให้น้ำพอประมาณในวงแคบ) - ช่วยทุเรียนผสมเกสรด้วยวิธีการปิดดอก 2. ระยะหางแย้ ระยะนี้กลีบดอกจะหลุด และเป็นจุดเริ่มต้นของผลทุเรียนประมาณ 14 วัน - ให้น้ำสม่ำเสมอและค่อยเพิ่มปริมาณน้ำขึ้นเรื่อย ๆ - ฉีดสารป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น เพลลิวไฟ เพลลิวแป้ง หนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน - ฉีดแคลเซียมโบรอนทางใบ 
ระยะผลเล็ก (เมษายน) 	30 วัน หลังดอกบาน - ให้น้ำสม่ำเสมอและเพิ่มน้ำให้ปริมาณการรดเป็นปกติ - ฉีดสารป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น เพลลิวไฟ เพลลิวแป้ง หนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน - ฉีดแคลเซียมโบรอนทางใบ - ฉีดพ่นปุ๋ย 0-52-34 ทางใบยับยั้งใบอ่อน - ตัดแต่งผลที่บิดงอ ผลปลายกิ่ง
ระยะผลกลาง (พฤษภาคม - มิถุนายน) 	30 - 60 วัน หลังดอกบาน - ให้น้ำสม่ำเสมอและเพิ่มน้ำให้ปริมาณการรดเป็นปกติ หากมีอากาศร้อนควรเพิ่มน้ำให้มากขึ้น - ใส่ปุ๋ย 15-5-20 ปริมาณ 1 - 2 กิโลกรัม/ต้น (อายุ 45 วัน หลังดอกบาน 1 ครั้ง และอายุ 60 วัน หลังดอกบาน 1 ครั้ง) - โยงกิ่ง/ตัดแต่งผล - ฉีดสารป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น เพลลิวไฟ เพลลิวแป้ง หนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน - ฉีดแคลเซียมโบรอนทางใบ 
ระยะเก็บเกี่ยว (กรกฎาคม) 	60-120 วัน หลังดอกบาน - ให้น้ำสม่ำเสมอและเพิ่มน้ำให้มากขึ้นตามสภาวะอากาศ - ใส่ปุ๋ย 0-0-60 ปริมาณ 1 กิโลกรัม/ต้น ** อายุ 80 วัน หลังดอกบาน - ฉีดสารป้องกันศัตรูพืช (โรคและแมลง) เช่น เพลลิวไฟ เพลลิวแป้ง หนอนเจาะผล และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน - ฉีดแคลเซียมโบรอนทางใบ