

องค์ความรู้ เรื่อง

การผลิตมังคุดคุณภาพตามมาตรฐาน GAP ในแปลงเรียนรู้ สพก.

เจ้าของความรู้ นายเฉลิม ศรีแฉล้ม เบอร์โทรศัพท์ 086-2668635



การจัดตารางการผลิตมังคุดรายเดือน

1

ธันวาคม

ขั้นตอนเตรียมต้นในพร้อมออกดอก

จัดการปุ๋ยเพื่อชักนำการแตกใบอ่อน
(หลังเก็บเกี่ยว)

- หว่านปุ๋ยคอกใต้ทรงพุ่มอัตรา 10 ก.ก./ต้น
- คลุมโคนด้วยเศษซากพืช
- กำจัดวัชพืช (หลังเก็บเกี่ยว)

2

มกราคม

ชักนำตาออก ใช้น้ำ 100 ลิตรผสม
น้ำนมวัวสภาพสุทธาจากพืช 2 ลิตร
ฉีดพ่นเพื่อให้ต้นสมบูรณ์
และมีอายุตาบอดมากกว่า 9 สัปดาห์
ก่อนออกดอก

3

กุมภาพันธ์

- ป้องกันเชื้อราที่จับใบ ใช้น้ำ 100 ลิตร
ผสมน้ำนมวัวสภาพสุทธาจากพืช 2 ลิตร
และเชื้อราไตรโคเดอร์มา 2 ลิตร ฉีดพ่น
ในหัวทรงพุ่ม
- ตัดแต่งกิ่งที่อยู่ด้านข้างของทรงพุ่มที่ประสานกันออก
ให้มีช่องว่าง 50 ซม.
- ตัดยอดในส่วนที่สูงเกินต้องการออก
- ตัดกิ่งประธาน หรือกิ่งรองออก
ด้านละ 1 - 5 กิ่ง เพื่อเปิดเพื่อให้แสงสว่างส่อง
เข้าไปในทรงพุ่ม

4

มีนาคม

จัดการปุ๋ยเพื่อเตรียมความพร้อมออกดอก

- ใช้น้ำ 100 ลิตร+กำมะถัน 200 กรัม +
ไตรโคเดอร์มา ละลายน้ำ 2 ลิตร ฉีดพ่น
เพื่อกำจัดไรแดง
- ใส่ปุ๋ย สูตร 8 - 24 - 24 เพื่อชักนำการ
ออกดอก
- ฉีดพ่นเป็ไตรเลียมมอบ เมื่อเริ่มแทง
ตาออก

5

เมษายน

การจัดการในการติดผล

- ประเมินผลผลิตต่อต้น ถ้ามีจำนวนผล
> 50 % ของยอดทั้งหมด ให้ใส่ปุ๋ยยูเรีย
อัตรา 3-5 กก./ต้น รดน้ำให้ชุ่ม เพื่อให้
ผลร่วงเหลือประมาณ 45-50 %

การส่งเสริมพัฒนาการของผล

- ใส่ปุ๋ยเคมี 13-13-21 อัตรา 2 กก./ต้น เท่ากับ
1/3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของทรงพุ่ม
- ใช้น้ำ 100 ลิตร+น้ำนมวัวสภาพสุทธาจากพืช 2 ลิตร
ฉีดพ่นทุก 7 วัน

6

พฤษภาคม-มิถุนายน

จัดการน้ำเพื่อพัฒนาการของผล

- เพิ่มปริมาณการใช้น้ำจัดการปุ๋ย เพื่อเพิ่ม
ปริมาณผลผลิตคุณภาพ
- จัดการปุ๋ยเพื่อความพร้อมของผล
- ใช้น้ำ 100 ลิตร+น้ำนมวัวสภาพสุทธาจากพืช
2 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน

7

กรกฎาคม

จัดการน้ำเพื่อพัฒนาการของผล

- เพิ่มปริมาณการใช้น้ำจัดการปุ๋ย เพื่อเพิ่มปริมาณ
ผลผลิตคุณภาพ
- จัดการปุ๋ยเพื่อความพร้อมของผล
- ใช้น้ำ 100 ลิตร+น้ำนมวัวสภาพสุทธาจากพืช
2 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน

8

สิงหาคม -ตุลาคม

- ป้องกันผลผลิตเสียหาย จากการเก็บเกี่ยวโดย
ใช้เครื่องมือที่ป้องกันมังคุดผลร่วง หรือกระแทก
รุนแรงระงับอย่างให้ช้ำหัก หรือกลีบเลี้ยงชำเลื่อ
เก็บเฉพาะผลที่สุกแก่ในระยะสายเลื่อ
- ป้องกันผลผลิตเสียหาย ระหว่างการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวในส่วนไม่เหมาะสม

