



การผลิตทุเรียนอัตลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี (ทุเรียนปราจีน)

ทุเรียนปราจีน

เนื้อสีเหลือง ฝักรู หยาบ เส้นใยน้อย หวานมัน เปลือกผลบาง ผิวเปลือกสีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้ม หนามถี่



นางวันเพ็ญ สมนอย

เกษตรกรต้นแบบ

การผลิตทุเรียนของจังหวัดปราจีนบุรีส่วนใหญ่แล้วจะผลิตภายในครอบครัว เนื้อที่ 5 - 30 ไร่ ฉะนั้นเกษตรกรชาวสวนจึงพิถีพิถันในการผลิตทุเรียนในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบำรุงต้นก่อนการออกดอก การให้ปุ๋ย การให้น้ำ โดยจะใช้สารเคมีน้อยมาก หรือบางส่วนไม่ใช้สารเคมีเลย

การตัดทุเรียนจะตัดตามที่มีการจดบันทึกหลังจากดอกบาน หรือในพันธุ์หมอนทอง นับหลังจากดอกบาน 120 วัน ก้านยาว 130-140 วัน และพันธุ์ชะนี 110 - 120 วัน เวลาตัดจะมีการใส่ภาชนะอย่างดี และมีการปิดแมลงที่ติดไปกับผลทุเรียนออก จากนั้นจะวางบนแผ่นพลาเกลอย่างดี เพื่อรอการจำหน่าย ทุเรียนปราจีนจึงเป็นทุเรียนที่ "สุกธรรมชาติ" ไม่มีการปียายา จึงทำให้ได้ทุเรียนคุณภาพ ด้วยวิธีการผลิตที่ประณีต

ระยะการเจริญทางใบ

1. ทำใบ ชุดที่ 1 : ทางดิน หว่านกระดูกป่น ต้นละ 30 ก. + ปุ๋ยเคมี สูตร 15 - 0 - 0 ปริมาณ 15 ก./ต้น ทางน้ำ ใช้กระดูกป่นแช่น้ำ 10 ล. + ฮอริโมนเร่งรากกระชากใบ ทุก 7 วัน เป็นเวลา 14 วัน เร่งให้ใบเพลสลาด โดยการฉีดฮอริโมนเร่งรากกระชากใบ + สาหร่าย และ แคลเซียมโบรอน
2. ทำใบ ชุดที่ 2 : แบบเดียวกับชุดที่ 1
3. ทำใบ ชุดที่ 3 : แบบเดียวกับชุดที่ 1 พร้อมสะสมอาหาร โดยการฉีดฮอริโมนไข่ + ปุ๋ยเคมี สูตร 8 - 24 - 24 (ใบจะสะสมอาหารเต็มที่)

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ระยะเก็บเกี่ยว : เก็บเกี่ยวที่เปอร์เซ็นต์การสุกแก่มากกว่า 85 - 90 % จะตัดทีละลูก ด้วยความประณีต โดยนับจากวันที่เป็นหางแฉ่เป็นเวลา 110 - 120 วัน

ระยะชักน้ำดอก : ผสมผสานอากาศเริ่มหนาว มีลมเย็น จะงดให้น้ำเพื่อให้ต้นทุเรียนเครียดและทิ้งใบประมาณ 10 ใบ ให้น้ำและปล่อยฮอริโมนกระชากดอกอื่นใบ + ปุ๋ยเคมี สูตร 13 - 0 - 46 (300 ก./น้ำ 20 ล.) + สาหร่าย + แคลเซียมโบรอน ไปด้วย เป็นเวลา 1.5 ชม. /วัน และฉีดฮอริโมนกระชากดอกอื่นใบตามท้องกิ่ง

ระยะไข่น้ำ : ลดปริมาณให้น้ำลง เหลือ 20 นาที/ครั้ง วันเว้นวัน เป็นเวลา 2 - 3 อาทิตย์

ระยะหยียดต้นหนุ : ให้น้ำแค่บริเวณทรงพุ่มห่างจากโคนต้น รศมี 1 ม. เพื่อชักน้ำให้ดอกเกิดบริเวณโคนกิ่ง

ระยะมะเขือพวงเล็ก : เพิ่มปริมาณให้น้ำเป็น 35 นาที/ครั้ง วันเว้นวัน เพื่อให้ต้นทุเรียนแตกใบอ่อน

ระยะมะเขือพวงใหญ่ : ใบอ่อนที่ชักน้ำให้แตกใหม่จะเริ่มเพลสลาด

ระยะดอกบาน : ลดปริมาณให้น้ำลง เหลือ 10-15 นาที/ครั้ง วันเว้นวัน แล้วช่วยผสมเกสรดอกทุเรียน เวลา 19.00 - 20.00 น. จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้าช่วยผสมเกสร โดยจะทำการผสมเกสรทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองก่อนแล้วมาปิดดอกผสมเกสรทุเรียนพันธุ์หมอนทอง โดยจะปิดดอกเป็น 4 มุม เพื่อให้ทุเรียนผสมเกสรได้อย่างสมบูรณ์

ระยะหางแฉ่ : ลดปริมาณให้น้ำลง เหลือ 10 นาที/ครั้ง วันเว้นวัน และเพิ่มปริมาณการให้น้ำเป็น 15 นาที 20 นาที 25 นาที จนเพิ่มเป็น 30 นาที/ครั้ง ปล่อยฮอริโมนบำรุงข้าวเหนียว + กระดูกป่นแช่น้ำ + ยิปซัม ไปด้วย การให้น้ำ

ระยะผลเล็ก : ปล่อยฮอริโมนบำรุงข้าวเหนียว + กระดูกป่นแช่น้ำ + ยิปซัม ไปด้วย การให้น้ำ 30 นาที/ครั้ง

ระยะผลโต : ปล่อยฮอริโมนบำรุงข้าวเหนียว + กระดูกป่นแช่น้ำ + ยิปซัม ไปด้วย การให้น้ำ 35 นาที/ครั้ง

