



ปฏิทินการผลิตเงาะนอกฤดูคุณภาพ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช



ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แตกใบอ่อนเจริญเติบโตทางใบ

- ตัดแต่งกิ่งให้มีการแตกกิ่งใหม่ สะสมอาหาร
- ชักนำการแตกชุดใบใหม่ 3-4 ชุด (30-45 วัน/ชุดใบ)
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-5 อัตรา 1 กก./ต้น แบ่งใส่ 20 วัน/ครั้ง
- ให้ปุ๋ยและสารอาหารทางใบ
- ให้น้ำวันเว้นวัน

พักตัวเตรียมออกดอก

- กำจัดวัชพืช กวาดบริเวณใต้ทรงพุ่มให้โล่ง
- ใส่ปุ๋ยทางดิน 8-24-24 อัตรา 1-2 กก./ต้น + ให้อาหารทางใบ
- รดน้ำ 1 วัน ปุ๋ยละลาย แล้วหยุดให้น้ำ 20 วัน

ออกดอก

- ฉีดพ่นทางใบด้วยฮอร์โมนสาหร่าย/ปุ๋ยเกร็ด 13-0-46 เพื่อเปิดตาออก
- ดอกบาน ให้น้ำ 2 วัน/ครั้ง (ครั้งละ 1 ซม.)

ดอกบานและติดผล

- ดอกบานสม่ำเสมอ ลดการให้น้ำ 1 ซม. เหลือ 20-30 นาที/วัน
- ระยะติดผลอ่อนใส่ปุ๋ยทางดิน 15-15-15 อัตรา 1-2 กก./ต้น จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน/ครั้ง)
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-15 อัตรา 1-2 กก./ต้น จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน/ครั้ง)
- ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 10-5-20 อัตรา 1-2 กก./ต้น ใส่ 1 ครั้ง (ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือน)
- ให้ปุ๋ยแคลเซียมโบรอน 10 วันครั้ง จนเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว

- เลือกตัดเฉพาะผลที่แก่ (สุก) ตามความต้องการของตลาด
- คัดคุณภาพก่อนจำหน่าย
- แช่น้ำเพื่อให้ผลสด
- บรรจุลงในภาชนะ



ภาพโดย : ก้องอริญ คงวิทย์ใหม่
สำนักงานเกษตรอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช