

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะเขือเทศโรงงาน

พันธุ์

กลุ่มผลใหญ่
แบบไม่ทอดเลื่อยถึงทั้งทอดเลื่อย



ดินที่เหมาะสม

ดินร่วน ระบายน้ำดี pH 4.5-6.8
ไถลึก 30-40 cm. ตากดิน 15 วัน



เวลาเพาะปลูกที่เหมาะสม
ต.ค.-ธ.ค

ใช้ไตรโคเดอร์มา
ป้องกันและจัดการโรคเน่าคอดิน
เหี่ยวเหลือง และโรคจากเชื้อรา

ไตรโคเดอร์มา



ปุ๋ยอินทรีย์
รองกันหลุม



เพาะกล้า
20-25 วัน

ใส่ปุ๋ย 15-15-15
หลังปลูก 15 วัน

ใส่ปุ๋ย 46-0-0
อายุ 60 วัน

ตัดผลเล็ก
พ่น แคลเซียม-โบรอน
**ป้องกันโรคกันเน่า

รักษาความชื้นในดิน ให้พอเหมาะช่วยควบคุมโรคพืช



ยกแปลงกว้าง
75 cm.
ระยะปลูก 30 cm.

ระบบการให้น้ำ
ระบบน้ำตามร่องน้ำ ระบบน้ำ
หยด ระบบสปริงเกอร์
ให้ช่วงเช้า

***ระยะติดผลลดการให้น้ำ



ป้องกันและกำจัด
หนอนชอนใบ หนอนเจาะสมอ
ฝ้าย ด้วย แบคทีเรีย BT / สาร
สกัดสะเดา ไวรัส NPV
**สารเคมีทางเลือกสุดท้าย

จัดทำโดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย